

HSU – passage undersøgelse af æggeledere

Som led i din barnløshedsudredning skal du have lavet en undersøgelse af passagen gennem dine æggeledere.

Denne undersøgelse laves for at sikre korrekt passage af æg og sædceller.

Hvis der ikke er ordentligt passage, kan du have svært ved at blive gravid, idet ægget kan have svært ved at blive befrugtet.

Man kan f.eks. have dårlig eller ingen passage igennem æggelederne efter en underlivsinfektion. Infektionen kan man for eksempel have fået som følge af smitte med klamydia.

Undersøgelsen foretages på ca 8. - 10. dagen efter sidste menstruation.

Du skal kontakte klinikken på menstruationens 1. dag, og aftale tid til HSU.

Undersøgelsen

Varighed 5-10 min. Vi anbefaler at du tager lidt smertestillende (400 mg Ipren og 1g Panodil) 1 time før mødetidspunktet.

Et tyndt plast kateter(rør) føres ind gennem livmoderhalsen og op i livmoderhulen. Det kan føles som menstruationssmerter.

Gennem plastkateteret sprøjtes lidt passagevæske op i livmoderhulen.

Lægen kan nu se om der er passage ud i æggelederne.

Plastkateteret fjernes herefter.

Du kan umiddelbart efter undersøgelsen gå på arbejde.

Efter undersøgelsen planlægges det videre forløb i din barnløsheds behandling.

Opstår der indenfor de kommende dage smerter, feber eller blødning skal du kontakte klinikken.